



# Legenda


## Tipi forestali

- Aceri-frassineto tipico var. con ontano nero
- Aceri-frassineto tipico var. con carpino bianco
- Alneto di ontano nero d'impluvio
- Betuleto secondario
- Betuleto secondario var. del pianalto
- Castagno delle cerchie moreniche occidentali
- Corileto
- Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone
- Formazioni antropogene non classificabili
- Formazioni di ciliegio tardivo
- Formazioni di pioppo tremulo
- Pineta di pino silvestre planiziale
- Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione
- Querceto di quercia rossa
- Querceto di farnia con olmo
- Querceto di rovere e/o farnia del pianalto
- Querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali
- Quercu-carpinetu dell'alta pianura
- Rimboschimenti di conifere
- Rimboschimenti di latifoglie
- Robinieto misto
- Robinieto puro
- Saliceto a Salix caprea
- Saliceto di ripa



## PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

### TAV. 3.4- CARTA DELLE TIPOLOGIE FORESTALI

BASE CARTOGRAFICA:		CTR
FONTE DATI:		P.S. Boschi del Parco e rilievi
SCALA:	1: 10.000	
DATA:	12/25	
<b>GRUPPO DI LAVORO:</b>		
		<b>Studio ForST Network:</b> Dott. for. Nicola Gallinaro Dott. for. Samuele Bettinsoli Pian. terr. Linda Zanetti

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE:
02	12/25	